

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-5-70 059841

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 = Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 2 au Bulletin du mois de Mai 1970

14 Mai 1970

Avertissement

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Dans notre dernier avis, en date du 8 Mai, nous signalions que le traitement conseillé serait à renouveler en cas de pluies abondantes, sans attendre un nouvel avis de la Station.

Les précipitations annoncées furent plus importantes que prévues. Dans de nombreuses régions de la Circonscription et notamment dans le Nord du département du BAS-RHIN et en MOSELLE, la hauteur des pluies recueillies au cours des journées du 10 et 11 Mai, dépasse 100 m/m.

Par suite d'un lessivage important, les arbres se trouvent actuellement sans protection. Il est urgent de renouveler le traitement des pommiers et des poiriers, d'autant plus que les projections d'ascospores sont très nombreuses et jugées comme arrivant à leur maximum.

Ce traitement contre les Tavelures devra être exécuté dès qu'il sera possible de pénétrer dans les vergers avec les appareils de traitement.

Information

V I G N E

CIGARIERS

De nombreux Cigariers se manifestent dans divers secteurs de notre vignoble, principalement dans les régions de MOLSHEIM (67) et de RIBEAUVILLE (68).

Nous invitons les viticulteurs à visiter leurs parcelles de façon à pouvoir intervenir contre ce ravageur en cas de nécessité.

On utilisera en pulvérisation une bouillie à base de D.D.T., à 100 g de M.A./hl, ou d'Arséniate de plomb, à 80 g de M.A./hl.

ARAIGNEES ROUGES

Les premières éclosions furent enregistrées au cours de la semaine dernière. Il est cependant trop tôt pour réaliser le traitement aphicide.

GRANDE CULTURE

BETTERAVES SUCRIERES

SILPHE DE LA BETTERAVE

Les Silphes viennent de se manifester avec une certaine virulence dans quelques parcelles de la région de KRAFFT (67). Elles risquent de devenir très actives dans le RIED au cours de ces prochains jours.

Dans les parcelles où leur présence aura pu être révélée, traiter en poudrage ou en pulvérisation, avec une spécialité à base de Parathions, Dieldrine, Lindane ou D.D.T.

C O L Z A

CHARANCON DES SILIQUES

Nous rappelons que le Charançon des siliques est très actif cette année et qu'un traitement devrait être envisagé sur l'ensemble des cultures de colza, surtout en Alsace. Ce traitement est d'autant plus important pour les cultures de la HARDT, où la CECIDOMYIE DES SILIQUES commence à se manifester. Il est, en effet, reconnu que la Cécidomyie des siliques s'installe plus facilement après une attaque de Charançons.

Si cela n'est déjà fait, traiter au cours de la présente semaine (vous reporter à notre Note du 8 Mai).

H O U B L O N

MILDIOU

Nous conseillons de renouveler le traitement contre le Mildiou du houblon dans la période du 19 au 21 Mai. Apporter beaucoup de soin à la réalisation de ce traitement.

CULTURES MARAICHIERES

MOUCHE DE L'ASPERGE

Les sorties de Mouche de l'asperge, encore peu importantes, pourront s'intensifier rapidement dès le relèvement des températures.


Dans les aspergeraies de moins de trois ans, qui ne sont pas en production, un traitement insecticide doit être envisagé.

Pour le choix du produit, se référer à la liste en votre possession.

Le Responsable de la Station
D'Avertissements Agricoles :
C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

SILPHE OPAQUE



Adulte.



Larve.